

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**06.03.2015 № 124**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ UA/10461/01/01**

**ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**31.01.2017 № 69**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**

**КОЛИКИД®**  
**COLLICKID®**

**Состав:**

*действующее вещество:* simethicone;

1 таблетка содержит симетикона 125 мг;

*вспомогательные вещества:* магния-алюминия силикат, лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфат, кислота стеариновая, кремния диоксид коллоидный, кросповидон, повидон 29/32, Opadry II 85G 52218 желтый.

**Лекарственная форма.** Таблетки, покрытые оболочкой.

*Основные физико-химические свойства:* овальные, гладкие с обеих сторон таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Средства, которые применяются при функциональных кишечных расстройствах. Силиконы.  
Код АТХ А03А Х13.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Симетикон, который входит в состав препарата, – это нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество, изготовленное на основе кремния, является пеногасителем. Он изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, которые образуются в кишечнике, и вызывает их разрушение. Газы, которые высвобождаются при этом, могут как поглощаться стенками кишечника, так и выводиться из организма благодаря перистальтике кишечника. Применение симетикона до начала диагностических исследований органов брюшной полости предупреждает возникновение дефектов изображения, вызванных пузырьками газа; способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным веществом, что предотвращает разрыв контрастной пленки даже в случае вздутия кишечника.

*Фармакокинетика.*

Симетикон действует исключительно на поверхности пузырьков газа и не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта. Симетикон не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта и после перорального приема выводится в неизменном виде. Симетикон не оказывает центрального действия.

## **Клинические характеристики.**

### ***Показания.***

- Симптоматическое лечение нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, связанных с газообразованием, например, метеоризм, в том числе в послеоперационный период.
- Как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости (рентгенография, ультразвуковое исследование) и при подготовке к гастродуоденоскопии.
- Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами).

### ***Противопоказания.***

- Повышенная чувствительность к препарату и его компонентам.
- Кишечная непроходимость.
- Обструктивные заболевания пищеварительного тракта.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

Левотироксин может связываться с симетиконом. Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом.

### ***Особенности применения.***

При повторном появлении жалоб или при длительных жалобах со стороны пищеварительного тракта следует обратиться к врачу.

Препарат содержит лактозу. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Клинических данных по применению препарата Коликид® беременными нет. Поскольку активный компонент не всасывается слизистой оболочкой пищеварительного тракта, не следует ожидать какого-либо действия лекарственного препарата на плод или накопления препарата в грудном молоке.

Применение препарата Коликид® в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### ***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.***

Поскольку симетикон является инертным веществом, не абсорбируется, влияние на управление автотранспортом или другими механизмами практически исключено.

### ***Способ применения и дозы.***

Таблетки Коликид® применять перорально взрослым и детям старше 12 лет. Прием препарата не зависит от приема пищи.

Симптоматическое лечение при жалобах со стороны желудочно-кишечного тракта: по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Как вспомогательное средство при проведении диагностических исследований органов брюшной полости: по 1 таблетке 3 раза в сутки за день до исследования и еще 1 таблетку – утром в день его проведения.

Как пеногаситель при интоксикациях поверхностно-активными веществами (стиральными порошками или другими моющими средствами): дозировка зависит от тяжести интоксикации. Минимальная рекомендованная доза – 3 таблетки.

Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально. При необходимости препарат можно принимать длительное время.

### ***Дети.***

Коликид®, таблетки, применяют детям в возрасте от 12 лет.

Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают в виде жидких лекарственных форм.

***Передозировка.***

До сих пор случаи передозировки неизвестны. Поскольку симетикон в химическом и физиологическом отношении инертен, то интоксикация практически исключена. При использовании доз, больших, чем рекомендовано, следует обратиться к врачу.

***Побочные реакции.***

*Со стороны иммунной системы:* аллергические проявления, реакции гиперчувствительности, включая зуд, кожную сыпь, крапивницу.

***Срок годности.***

3 года.

***Условия хранения.***

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

***Упаковка.***

По 7 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной упаковке.

По 15 таблеток в блистере; по 1, 2 или 4 блистера в картонной упаковке.

***Категория отпуска.***

Без рецепта.

***Производитель.***

ООО «КУСУМ ФАРМ».

***Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.***

40020, Украина, Сумская область, г. Сумы, ул. Скрябина, 54.

***Дата последнего пересмотра.***

31.01.2017 № 69